








# Pleurapunctie

31.015N


Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper  
www.yperman.net • 057 35 35 35  
info@yperman.net •     

31.015N • 20180608  
Diensthoofd inwendige geneeskunde

## Waarom wordt een pleurapunctie uitgevoerd?

Klachten van kortademigheid te verlichten bij veel pleuravocht = vocht tussen de longvliezen = vocht in de pleuraholte.

Vocht af te nemen voor verder onderzoek.



## Vorbereiden

U moet niet nuchter zijn voor een pleurapunctie.

Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte als u bloedverdunners (pilletjes of spuitjes) neemt.

## Verloop

Duur: 10 à 20 minuten.

U gaat rechtop zitten op de onderzoekstafel. Een krukje geeft steun aan uw voeten. Uw armen rusten op een kussen.

De arts zoekt de plaats waar het vocht zit. Dit kan op verschillende manieren:

- Kloppen op borstkas
- Luisteren met stethoscoop
- Echografie

Daarna wordt de huid lokaal verdoofd, het vocht aangeprikt met een naald en catheter en gebeurt de evacuatie van vocht.

Soms wordt na het aanprikken aanvullend een catheter ingebracht en ter plaatse gelaten (pigtail) om verder vocht te evacueren.

## Nazorg

Op indicatie wordt er een röntgenfoto genomen van de thorax.

## Ongemakken risico's

Een pleurapunctie is een **veilig** onderzoek.

Tijdens of na een pleurapunctie ontstaat soms een prikkelhoest.

Een mogelijke complicatie van een pleurapunctie is een klaplong of pneumothorax.

## Contacteer onmiddellijk een arts

Contacteer onmiddellijk uw arts bij een van volgende problemen na het onderzoek:

- Bloed ophoesten
- Ademhalingsproblemen
- Pijn op de borst