



Het toedienen van medicatie met een inhalatiekamer (puffs)

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
057 35 35 35 • info@yperman.net • www.yperman.net



56.017N • 180417
Diensthoofd Pediatrie

Het toedienen van medicatie met een inhalatiekamer (puffs)

- De medicatie **schudden** voor gebruik.
- Bij elke dosis medicatie moet het kind **minstens 5x inademen**.
Om hier zeker van te zijn, tellen we 10 ademhalingen = klepbewegingen.
- Men moet 5 minuten wachten om een tweede dosis medicatie toe te dienen.
- Bij het inladen van een dosis geneesmiddel, moet je de inhalatiekamer **horizontaal houden**. De toediening zelf kan in om het even welke positie gebeuren.
- Indien je meerdere soorten medicatie moet toedienen, dient de **juiste volgorde** gerespecteerd te worden + eventueel wat tijd tussen te laten.
- Na het toedienen van medicatie moet het kind iets drinken of moet het zijn tanden poetsen.
- Gebruik de medicatie enkel op doktersvoorschrift.
- Onderhoud de inhalatiekamer goed: masker spoelen na elke toediening, wekelijks demonteren en wassen, nadien aan de lucht laten drogen (zie ook de bijsluiter).