

# RAADGEVINGEN BIJ DE PLAATSING VAN TANDIMPLANTATEN



Dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Wat volgt zijn een aantal raadgevingen en geruststellingen die u doorheen een comfortabele en vertrouwensvolle genezing zullen loodsen.

Bij een implantaat-operatie wordt een titanium schroef ingebracht in het kaakbot om deze later bij de tandarts te gebruiken als pijler voor een kroon, een brug of een uitneembare prothese.

1. Na de ingreep kan er zwelling optreden van de wang aan de geopereerde zijde. Deze zwelling is maximaal de tweede dag en zal vanaf de vierde dag geleidelijk afnemen. Door onmiddellijk ijs (verpakt in plastic zak en handdoekje) tegen de wang van de geopereerde zijde te houden kan de zwelling beperkt blijven. Het is nuttig om dit gedurende 24 uur te blijven doen. De eerste nacht slaapt U best met een extra hoofdkussen of zet U het hoofduiteinde van het bed in lichte hoogstand. U slaapt ook best op de andere zijde of op de rug. Indien na vier tot zes dagen terug een zwelling of een toename van de pijn zou optreden is het wenselijk met ons contact op te nemen.
2. De zwelling kan gepaard gaan met ongemak en matige pijn. Neem zo snel mogelijk na de ingreep een pijnstillers en wacht niet tot de pijn optreedt. Bij zeer hevige pijn is het opnieuw raadzaam ons te contacteren.
3. Lichte koorts is normaal de dag volgend op de ingreep. Rusten en veel drinken is hier geboden
4. Het is raadzaam om gedurende de dag van de ingreep de mond niet te spoelen en warme dranken te vermijden. Zachte voeding is aan te raden gedurende de eerste dagen. De dag na de ingreep moeten de tanden gereinigd worden met een zachte tandenborstel en dient men de mond te spoelen met een mondspoelmiddel.
5. Gedurende het ganse genezingsproces dient een rookstop aangehouden te worden. Roken verhoogt ernstig de kans op vroegtijdig verlies van het implantaat en/of het gereconstrueerde bot.
6. Laat gedurende de eerste twee weken de prothese (zoveel mogelijk) uit. Na deze periode kan de prothese door uw tandarts aangepast worden.
7. Pijn aan de mondhoeken kan gemakkelijk verholpen worden met vaseline.

8. De hechtingen die werden geplaatst zijn zelfverterend. Deze zullen, indien nog aanwezig, bij de nacontrole over 1 tot 2 weken verwijderd worden.
9. Soms kan lokaal een blauwe verkleuring van de huid optreden. Deze kan bij een ingreep ter hoogte van de onderkaak zelfs tot in de hals reiken. Dit zal verdwijnen binnen de één tot twee weken.
10. Postoperatief kan ook een doofheidsgevoel of 'veranderd' gevoel in de onderlip en/of de tong ontstaan (paresthesie); dit is bijna steeds tijdelijk en verdwijnt binnen enkele dagen tot weken.

De bovenstaande informatie is slechts een leidraad doorheen de periode die volgt onmiddellijk na de ingreep. Indien er echter meer vragen zijn, gelieve ons te contacteren.

Wij wensen u een vlot herstel toe!

Dr. Olivier Bouckenooghe  
Dr. Evert Matthys  
Dr. Carlos Verhelst