



Plexus coeliacus blokkade

79.035N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

79.035N • 20180606
diensthoofd pijnkliniek

Doel van de behandeling:

Deze behandeling wordt toegepast bij ernstige pijnklachten ten gevolge van een gezwel van organen in de bovenbuik. De organen kunnen zijn de alvleesklier, de maag en de lever. Bij de behandeling wordt het zenuwnetwerk (=plexus coeliacus) in de bovenbuik geblokkeerd. Het geeft over het algemeen een goede vermindering van de pijnklachten en het effect houdt gemiddeld enkele maanden aan.

Voorbereiding:

De voorbereiding hangt af van het tijdstip van de behandeling. Als u 's ochtend een afspraak heeft dan dient u vanaf 24.00 uur de avond ervoor nuchter te zijn. (nuchter= niet eten en/of drinken) Als u 's middags een afspraak heeft dan mag u 's ochtends een licht ontbijt nemen. (licht ontbijt= beschuit en kopje thee)

Bloedverduunners:

Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt dan mag u deze een aantal dagen voor de behandeling niet meer innemen. Uw behandelend arts van de Chronische Pijnkliniek zal u hierover informeren. Eventueel zal de arts voor u een aanvullend laboratorium onderzoek aanvragen. De uitslag is bepalend voor het wel of niet doorgaan van de behandeling.

Opname:

Voor deze ingreep is het vaak noodzakelijk dat u opgenomen wordt op de verpleegafdeling.

Behandeling:

Op het afgesproken tijdstip wordt u naar de operatiekwartier kamer gereden waar u eerst en vooral een infuusnaaldje krijgt. Hier zijn naast uw behandelend arts ook nog een verpleegkundige aanwezig. De verpleegkundige helpt u bij de juiste houding op de behandeltafel. De arts zal onder röntgendoorlichting de plaats bepalen, (de huid verdoven) en de naald opschuiven tot in het zenuwnetwerk van de bovenbuik. Vervolgens worden de medicijnen door de naald gespoten. Na de ingreep gaat u naar de recovery ruimte waar de verpleegkundige enkele controles zal uitvoeren. Hier vandaan gaat u terug naar de verpleegafdeling. Uw behandelend arts zal u daar opzoeken.

Napijn:

Het kan voorkomen dat u na de behandeling napijn heeft. Uw behandelend arts zal u dan een pijnstiller voorschrijven.

Resultaat:

Het is goed om te weten dat het resultaat van de behandeling na 1 à 2 dagen duidelijk wordt.

Complicatie:

Het kan voorkomen dat u na de ingreep last heeft van:

- diarree
- duizeligheid bij opstaan (hypotensie)

Deze complicaties zijn tijdelijk.

Als uiterst zeldzame complicaties kunnen optreden:

- dwarslaesie (=gedeeltelijke verlamming)
- verminderde functie van de blaas

Alle eventueel optredende complicaties dient u bij uw behandelend arts te melden.

Afspraak:

Uw behandelend arts zal u op de verpleegafdeling opzoeken en met u afspraken maken voor de controle. Heeft u toch nog vragen dan zijn wij bereikbaar op het telefoonnummer:

Chronische Pijnkliniek, **057/35.61.20**.

Wij hopen dat u door het lezen van deze folder voldoende bent geïnformeerd.

Heeft u toch nog vragen dan kunt u terecht bij de arts of de verpleegkundige van de Chronische Pijnkliniek.

Team Chronische Multidisciplinaire Pijnkliniek

Contact:

pijnkliniek@yperman.net
057 35 61 20

www.yperman.net/pijnkliniek



Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

79.035N • 20180606
diensthoofd pijnkliniek