








# PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis)

## Het gebruik van hiv-remmers om hiv-infectie te voorkomen

92.041N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper  
[www.yperman.net](http://www.yperman.net) • 057 35 35 35  
[info@yperman.net](mailto:info@yperman.net) •     

## Wat is PrEP?

PrEP is een behandeling voor mensen zonder hiv die een grote kans lopen om besmet te worden.

De medicatie voorkomt, bij inname volgens de richtlijnen van de arts, overdracht van hiv. Het is een pil en wordt verkocht onder de merknaam Truvada®.

PrEP kan op 2 manieren ingenomen worden:

Voor mannen en vrouwen	OF	Voor mannen
<p><b>Dagelijks 1 pil</b></p> <p><i>Op een vast tijdstip dat je zelf kiest Best met voedsel</i></p> <p><b>Sla geen dosis Truvada® over of stop niet met het innemen. Het missen van een dosis en een dosis overslaan kan uw kans op het oplopen van een hiv-infectie vergroten en u mogelijk resistent maken voor het geneesmiddel als u geïnfecteerd raakt met hiv.</b></p>		<p><b>Voor en na de seks</b></p> <p>° 2 pillen 2 tot 24 uur voor je anale seks gaat hebben ° 1 pil om de 24 uur tot 2 dagen na de laatste keer anale seks</p> <p><i>Best met voedsel</i></p>

Nota: lees voor het starten van Truvada® goed de 'educatieve PrEP-brochure voor risicopersonen'



## PrEP starten


Tijdens de eerste consultatie wordt het gebruik en mogelijke nevenwerkingen van Truvada® besproken. Om er zeker van te zijn dat u geen hiv of andere soa's hebt, zal er een bloedafname gebeuren in het ziekenhuis.

Indien u hiv negatief bent en er geen andere bloedafwijkingen (nier/leverproblemen) werden opgespoord, wordt een attest opgestuurd die bezorgd moet worden aan de mutualiteit. Na goedkeuring van de mutualiteit kan de medicatie opgestart worden.

Er moet een nieuwe bloedafname gebeuren 2 weken na opstart van de medicatie (dit kan eventueel bij de huisarts) om na te gaan of er geen toxische neveneffecten zijn opgetreden.

Nadien wordt er om de 3 maanden een bloedafname uitgevoerd in het ziekenhuis en komt u op consultatie: tijdens deze consultatie zal er nagekeken worden of de medicatie correct wordt ingenomen en of er bijwerkingen zijn. Ook vaccinaties worden besproken tijdens de consultatie (hepatitis A/B).

Daarnaast geven we ook voorschriften mee voor de volgende 3 maanden.



### Kostprijs Truvada®

Indien je in aanmerking komt voor terugbetaling, betaal je 11,90 euro voor 30 tabletten. De kostprijs voor de bloedafnames (remgeld) kunt u navragen op onze dienst.

### Voordelen PrEP

- PrEP voorkomt overdracht van hiv.
- Sommige PrEP-gebruikers hebben minder schrik om hiv op te lopen. Ze kunnen meer genieten van seks.

### Nadelen PrEP

- PrEP beschermt enkel tegen hiv, niet tegen andere soa's. Gebruik steeds een condoom als bescherming tegen andere soa's.
- PrEP gebruiken vraagt om een regelmatige medische opvolging (3-maandelijks).
- Mogelijke toxiciteit.

## Algemene informatie

### Adres en telefoonnummer secretariaat

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper  
Secretariaat Nefrologie- Infectieziekten: 057 35 71 80

### Dienst infectieziekten - arts

Dr. W. Terryn

### Dienst infectieziekten - verpleegkundigen (= centrale contactpersonen): 057 35 6748

Barbez Annelies  
Cuvelier Geert  
Gruwier Lies  
Segers Sofie

### Voor meer informatie:

[www.sensoa.be](http://www.sensoa.be)

[www.seksualiteit.be](http://www.seksualiteit.be)

Mannenseks.be: informatie over veilig vrijen en gezonde seks, voor mannen die seks hebben met mannen (MSM)

## Consultaties Infectieziekten

### Dienst Inwendige Geneeskunde JYZ

#### Dr. W. Terryn, consulent Aids Referentiecentrum UZ Gent

Op afspraak

057 35 71 80

Online afspraak maken via <http://myjyz.yperman.net/nefrologie@yperman.net>