



# Pre-operatieve MRSA screening en dekolonisatie

## INGREEP MET PROTHESE CHIRURGIE OF VOORZIENE OPNAME $\geq$ 5 dagen.

Geachte mevrouw,  
Geachte heer,

U ondergaat binnenkort een ingreep waarvoor u nadien gehospitaliseerd zal worden.

In dit kader gaat onze speciale aandacht uit naar de zogenaamde ziekenhuisbacterie **MRSA**.

Het is namelijk onze bezorgdheid om de postoperatieve fase optimaal te laten verlopen en de kans op verwickelingen, zoals infecties met MRSA, maximaal te vermijden. Bovendien willen we de verspreiding in ons ziekenhuis met MRSA vermijden.

Gezien u positief getest bent op MRSA en dus MRSA drager bent, zal u een dekolonisatie ondergaan om deze MRSA weg te nemen (zgn. MRSA dekolonisatie).

### Wat is MRSA?

**MRSA** staat voor **M**ethicilline **R**esistente **S**taphylococcus **A**ureus.

Stafylokokken zijn bacteriën die ongemerkt leven bij vele mensen, bij voorkeur in de neus of op de huid.

MRSA is een variant van deze bacterie en is niet meer gevoelig aan de klassieke antibiotica. Als u enkel drager bent van deze bacterie in de neus of op de huid, dan zal deze kiem net als de gewone stafylokok weinig onheil aanrichten. Voor **gezonde personen** is er dus **geen gevaar**.

Deze bacterie kan zich echter ook verspreiden naar andere plaatsen in het lichaam, bijvoorbeeld naar de blaas, de longen of een open wonde. Bovendien kan ze zich ook verspreiden naar andere patiënten.

MRSA kan een gevaar betekenen voor mensen met een ernstig verminderde weerstand en voor mensen die recent geopereerd zijn of moeten worden geopereerd. Een MRSA-infectie bemoeilijkt of vertraagt het genezingsproces.

### De dekolonisatie?

De dekolonisatie dient gestart te worden ten laatste 13 dagen voor de ingreep. Indien de ingreep vroeger valt dan 13 dagen, zal getracht worden om de operatie uit te stellen zodat de dekolonisatie kan doorlopen worden.

U krijgt via de pre-op volgende producten ter beschikking:

- Ontsmettende huidzeep (Hibiscrub®)
- Ontsmettende neuszalf (Bactroban®)
- Keeltabletten (Angiocine®)

De dekolonisatie verloopt als volgt:

#### Eerste 5 dagen:

- Dagelijks verse washandjes en handdoeken
- Voor het starten van de dekolonisatie uw bedlinnen verversen
- Was u 's morgens volledig (elke plaats van het lichaam) met de ontsmettende huidzeep (Hibiscrub®)
- Op dag 1 en dag 4 worden de haren met dezelfde zeep gewassen
- Breng drie maal per dag een weinig (grootte van luciferkopje) ontsmettende neuszalf (Bactroban®) met een wattenstaafje in het topje van ieder neusgat en u masseert dit goed in.



#### Dag 6 en 7:

- Onderbreek de dekolonisatie. Enkel wassen met gewone zeep.

#### Dag 8 tem 10:

- Laat u dagelijks opnieuw testen op MRSA (in totaal drie keer dus). De controles verlopen bij voorkeur op de afnamedienst van het labo (weekdagen: 7u30 – 20u15 en zaterdag: 8u00 – 12u15).

#### Dag 11 tem ingreep:

- Herstart de dekolonisatie zoals beschreven voor de eerste 5 dagen

### Dekolonisatieschema

Dag	Neuszalf (Bactroban®) + keeltabletten (Angiocine®)	Huid wassen	Haren wassen	Controle in ziekenhuis
1	8u 14u 20u	8u	8u	
2	8u 14u 20u	8u		
3	8u 14u 20u	8u		
4	8u 14u 20u	8u	8u	
5	8u 14u 20u	8u		
6				
7				
8				JA
9				JA
10				JA
11 en verder	8u 14u 20u	8u	8u	

### Vragen?

Indien u nog vragen hebt, kunt u steeds terecht bij uw behandelende arts of het team ziekenhuishygiëne.

**We wensen u alvast een spoedig herstel.**  
ziekenhuishygiëne 057 35 70 46

JYZ  
Briekestraat 12 • 8900 Ieper  
[www.yperman.net](http://www.yperman.net)